

NARZĘDZIE DIAGNOSTYCZNE

UWAGA!

Ten lek MAXON ACTIVE przeznaczony jest do leczenia zaburzeń wzrodu, czyli braku możliwości uzyskania lub utrzymania sztywności prącia wystarczającej do odbycia stosunku. Ten lek jest dla Ciebie, jeżeli jesteś dorosłym (≥ 18 . r.ż.) mężczyzną, a problemy ze wzrodem utrudniają Ci współżycie płciowe. Jeżeli nie spełniasz przynajmniej jednego z powyższych warunków, ten lek **NIE** jest dla Ciebie!

<p>Czy stosujesz leki używane do łagodzenia objawów choroby wieńcowej (dławicy piersiowej, bólu w klatce piersiowej), których przyjmowanie wraz z lekiem MAXON ACTIVE może zagrozić Twojemu życiu?</p> <ul style="list-style-type: none"> · nitroglicerynę (np. Nitrocard, Nitroderm, Nitromint, Minitran, Sustonit) · izosorbid (np. Effox, Isosorbide mononitrate Vitabalans, Isosorbidi mononitras Accord, Mono Mack, Mononit, Monosan, Olicard, Sorbonit) · pentaerytrytol (np. Galpent, Pentaerythritol compositum) · molsidominę (np. Molsidomina WZF) · nikorandył (np. Angedil, Nicorandil Dexcel Pharma) 	<p>TAK NIE WIEM</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>	<p>NIE</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p>
<p>Czy występują u Ciebie następujące objawy?</p> <ul style="list-style-type: none"> · w ciągu ostatnich 2 miesięcy pojawił się ból za mostkiem w klatce piersiowej · w ciągu ostatniego miesiąca zauważyłeś wyraźne pogorszenie samopoczucia · zwykle, codzienna aktywność fizyczna (np. mycie się, ubieranie) powoduje duszność, kołatanie serca lub wyraźne zmęczenie · często odczuwasz przyspieszone lub nierówne bicie serca · często miewasz zawroty głowy, wrażenie omdlewania · masz zwykle niskie ciśnienie tętnicze krwi (poniżej 90/50 mmHg) · masz zwykle wysokie ciśnienie tętnicze krwi (powyżej 150/90 mmHg) 	<p>TAK NIE WIEM</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>	<p>NIE</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p>
<p>Czy którakolwiek z poniższych sytuacji dotyczy Ciebie?</p> <ul style="list-style-type: none"> · w ostatnich 6 miesiącach przebyłeś zawał serca lub udar mózgu · w przeszłości doszło u Ciebie do utraty przytomności przy gwałtownej zmianie pozycji ciała · masz skrzywienie prącia, które utrudnia penetrację lub rozpoznaną chorobę Peyroniego (stwardnienie plastyczne prącia) · stosujesz już inne metody leczenia zaburzeń erekcji niż leki zawierające sildenafil · leczysz się z powodu zakażenia wirusem HIV · utraciłeś wzrok w jednym oku w wyniku innej przyczyny niż uraz, zaćma lub jaskra · rozpoznano u Ciebie dziedziczne zaburzenia funkcji siatkówki oka (takie jak tzw. zwyrodnienie barwnikowe) · rozpoznano u Ciebie rzadko występujące, dziedziczne nieprawidłowości dotyczące kształtu czerwonych ciałek krwi (tzw. niedokrwistość sierpowatokrwinkową) · rozpoznano u Ciebie marskość wątroby 	<p>TAK NIE WIEM</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>	<p>NIE</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p>
<p>Czy obecnie chorujesz na:</p> <ul style="list-style-type: none"> · chorobę wrzodową, której dolegliwości nasiliły się w ostatnim tygodniu (ból brzucha, nudności, wymioty) · ciężkie zaburzenia krzepnięcia krwi (np. hemofilia) · białaczkę (choroba nowotworowa krwi) · szpiczaka mnogiego (choroba nowotworowa szpiku kostnego) 	<p>TAK NIE WIEM</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>	<p>NIE</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p>

przynajmniej 1x **TAK**
lub 1x **NIE WIEM**

wszystkie **NIE**

**NIE,
nie możesz
stosować leku
MAXON ACTIVE
bez konsultacji
z lekarzem**

**TAK,
możesz stosować
lek MAXON ACTIVE**

Przed zastosowaniem
leku przeczytaj ulotkę
dołączoną
do opakowania

PAMIĘTAJ!

Problemy ze wzrodem mogą być wywołane innymi lekami, które przyjmujesz lub innymi chorobami, na które cierpisz. Właściwe leczenie niektórych schorzeń może spowodować ustąpienie zaburzeń wzrodu. Występowanie zaburzeń wzrodu jest również ważną wskazówką dla lekarza, która może pomóc mu w diagnostyce niektórych chorób, w tym chorób serca. Dlatego też w trakcie okresowych wizyt zawsze poinformuj swojego lekarza o problemach ze wzrodem i o tym, że przyjmujesz MAXON ACTIVE.