

Melatonina

Tonaxinum® spray



Suplement diety

12 ml

Melatonina Spray Tonaxinum® to suplement diety w postaci spray'u do stosowania wspomagająco:

- w przypadku trudności z zasypianiem
- przy zaburzeniach snu związanych ze zmianą stref czasowych²
- przy pracy zmianowej
- w zespole opóźnionej fazy snu³
- u osób niewidomych
- u osób w podeszłym wieku.

Opis działania preparatu: Dzięki zawartej melatoninie preparat pomaga w skróceniu czasu potrzebnego na zaśnięcie.³

Dodatkowo melatonina pomaga w łagodzeniu subiektywnego odczucia zespołu nagłej zmiany strefy czasowej.²

²Korzystne działanie występuje w przypadku spożycia 0,5 mg krótko przed pójściem spać pierwszego dnia podróży i przez kolejne kilka dni po przybyciu do celu podróży.

³Korzystne działanie występuje w przypadku spożycia 1 mg krótko przed pójściem spać.

Składniki: Woda, emulgator – polisorbitat 80, substancja wypełniająca – gliceryna, średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe, przeciwutleniacz – plamityniany ascorbylu, melatonina, aromat – olejek cytrynowy, substancja konserwująca – sorbinian potasu, regulator kwasowości – kwas cytrynowy, substancja słodząca – sukraloza.

Skład zalecaney do spożycia w ciągu dnia porcji preparatu:

Składnik	Zawartość w 1 aplikacji	Zawartość w 2 aplikacjach	RWS*
melatonina	0,5 mg	1 mg	**

*RWS – referencyjne wartości spożycia

** brak ustalonej normy zalecanego dziennego spożycia

Zalecana do spożycia w ciągu dnia porcja preparatu:
1 – 2 aplikacje na krótko przed snem.

Sposób użycia: Skierować rozpylacz w kierunku otwartych ust i nacisnąć pompkę tak, by rozpylić preparat na błony śluzowe w jamie ustnej lub pod język.

Warunki przechowywania: Preparat należy przechowywać w temperaturze pokojowej (15-25°C), w suchym miejscu, niedostępnym dla małych dzieci. Chronić przed światłem i wilgocią.

Ostrzeżenia: Nie należy przekraczać porcji preparatu zalecaney do spożycia w ciągu dnia. Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu. Kobiety w ciąży oraz karmiące piersią przed zastosowaniem preparatu powinny skonsultować się z lekarzem. Preparat nie może być stosowany, jako substytut zróżnicowanej diety. Preparat może osłabiać koncentrację i szybkość reakcji oraz wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę urządzeń mechanicznych w ruchu. Nie należy spożywać alkoholu podczas stosowaniu preparatu.

Zrównoważona dieta oraz zdrowy tryb życia są ważne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Dostępne opakowania: spray 12 ml

Producent:

Novascon Pharmaceuticals Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa
www.tonaxinum.pl