



Należy zapoznać się z właściwościami leku
przed zastosowaniem

Bausch & Lomb

Artelac[®]

Krople do oczu, roztwór 3,20 mg/ml

(Hypromellosem)

Skład: 1 ml roztworu zawiera:

substancję czynną:

metylohydroksypropylceluloza 3,20 mg

substancje pomocnicze:

cetrimid 0,10 mg

wersenian dwusodowy 0,10 mg

wodorofosforan sodu dwunastowodny 4,62 mg

dwuwodorofosforan sodu dwuwodny 1,01 mg

sorbitol 45,00 mg

woda do iniekcji 963,27 mg

pH roztworu 7,0 – 7,4

Lepkość – 7-13 mPa S

Opis działania

Środek typu sztuczne łzy. Służy także do zwilżania twardych soczewek kontaktowych.

Wskazania do stosowania

Leczenie objawowe wysychania rogówki i spojówki („Zespół suchego oka”) spowodowanego zaburzeniami wydzielania łez lub zaburzeniami czynnościowymi, w przebiegu chorób ogólnych lub miejscowych, prowadzącymi do niedomykalności powiek.

Preparat może służyć również do zwilżania twardych soczewek kontaktowych.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku.

Zalecane środki ostrożności

Krople należy stosować miejscowo do worka spojówkowego. Nie należy dotykać końcówki zakraplacza, ponieważ może to spowodować zanieczyszczenie zawartości butelki.

Stosowanie leku podczas ciąży i karmienia piersią

Lek może być stosowany podczas ciąży i karmienia piersią.

Wpływ leku na zdolność kierowania pojazdami mechanicznymi, obsługę maszyn i sprawność psychofizyczną

Po zakropleniu leku z powodu dużej jego lepkości, może dojść do trwającego kilka minut niewyraźnego widzenia.



TypoData 43777

Mat.-Nr.: 40660 PB 188/3-PL

Code-Nr.: 258



Format 120 x 180 mm
Farbe: Blau P 281 C
QuarkXPress 4.1

Schriftgröße: 8 pt

1. AK: 14.02.2005/kw 4. AK:

2. AK: 15.02.2005/kw

3. AK:

Freigabe / release

erneute Korrektur notwendig / additional correction required

Datum/date: Unterschrift/Signature:



W tym czasie nie należy kierować pojazdami mechanicznymi i obsługiwać maszyn.

Oddziaływanie z innymi lekami (interakcje)

Dotychczas nieznanne.

W przypadku stosowania innych kropli lub maści okulistycznych należy zachować odstęp 15-tu minut między podaniem poszczególnych leków, Artelac należy zakropić jako ostatni.



Dawkowanie i sposób stosowania

W leczeniu „Zespołu suchego oka” dawkowanie ustala się indywidualnie. Zwykle podaje się 3 do 5 razy na dobę lub częściej, 1 kroplę do worka spojówkowego.

Okres stosowania preparatu w celu nawilżania twardych soczewek kontaktowych jest nieograniczony.

Działania niepożądane

Ze względu na jeden ze składników leku, cetrymid, będący środkiem konserwującym, może wystąpić podrażnienie oka (pieczenie, zaczerwienienie, odczucie obecności ciała obcego w oku) a w przypadku dłuższego stosowania uszkodzenie rogówki.

Wystąpienie powyższych objawów powoduje konieczność odstawienia leku i skontaktowania się z lekarzem.

Przed zastosowaniem leku należy sprawdzić datę ważności podaną na opakowaniu (etykiecie), nie stosować leku po upływie terminu ważności.

Okres trwałości po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego wynosi 6 tygodni.

Przechowywać w temperaturze pokojowej, 15-25°C.

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Dostępne opakowanie

Buteleczka plastikowa 10 ml.

Nazwa i adres wytwórcy

Dr. Gerhard Mann, Chem.-pharm. Fabrik GmbH, Brunsbütteler Damm 165-173
13581 Berlin, Niemcy.

Data sporządzenia ulotki: 11.09.2001



Bausch & Lomb

40660 PB 188/3-PL