

# Cicatridina®

## Globulki dopochwowe z kwasem hialuronowym

**Skład:** Sól sodowa kwasu hialuronowego 5 mg, Centella Asiatica - ekstrakt olejowy 60 mg, wyciąg olejowy z nagietka 60 mg, wyciąg olejowy z aloesa 60 mg, ekstrakt olejowy z drzewa herbacianego 2 mg, glicerydy półsyntetyczne, BHT, izopropyl paraben, izobutyl paraben, butyl paraben.

**Wskazania:** Jako środek wspomagający regenerację błony śluzowej pochwy w leczeniu atrofii i dystrofii. Wspomaga gojenie się ran po porodzie, zabiegach ginekologicznych, dystrofii spowodowanej chemioterapią lub naświetlaniem jonizującym oraz w przypadku suchości pochwy, wywołanej również niedoborem estrogenów.

**Przeciwwskazania:** stwierdzona nadwrażliwość na jeden ze składników.

**Sposób użycia:** wprowadzić jedną globulkę wieczorem lub według wskazań lekarza głęboko do pochwy. W celu wyjęcia globulki z pojemnika pociągnąć za koniec nadciętego opakowania pęcherzowego.

**Wskazówki:** Długotrwałe stosowanie preparatu może wywołać reakcje nadwrażliwości; w takim przypadku zaleca się przerwanie leczenia i skonsultowanie się z lekarzem. Chronić przed dziećmi. Nie połykać. Unikać kontaktu z oczami.

**UWAGA:** Nie należy stosować po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu.

Szczelnie zamknięty pojemnik przechowywać w temperaturze od 4°C do 25°C, chroniąc go przed światłem i wysoką temperaturą.

**Opakowanie:** 10 globulek po 2 g WYRÓB MEDYCZNY

**Dystrybutor:** MIRALEX Sp. z o.o.

ul. Św. Szczepana 25, 61-465 Poznań, tel: 061 832 90 60; fax: 061 832 90 70  
miralex@miralex.pl; www.miralex.pl

Wytwórca: FARMA-DERMA S.R.L., Włochy



**Wskazania:** po porodzie, po zabiegach i badaniach ginekologicznych, po zabiegach chirurgicznych, po chemio- i radioterapii, przy suchości pochwy i dyspareunii.

- przyspiesza zabliznianie się ran w pochwie
- przywraca naturalny proces gojenia
- odbudowuje błonę śluzową pochwy w procesach atrofii i dystrofii
- łagodzi takie objawy jak: uczucie napięcia i suchości pochwy, świąd, pieczenie, bóle przy współżyciu płciowym – już w pierwszym tygodniu leczenia



Oddaje, co natura zabiera

# Cicatridina®

Globulki dopochwowe z kwasem hialuronowym



WSPOMAGA GOJENIE SIĘ RAN

m.in. po porodzie i zabiegach ginekologicznych  
REGENERUJE BŁONĘ ŚLUZOWĄ POCHWY



**NOWOŚĆ**

bez recepty w aptekach

dla  
kobiety

Po porodzie, zabiegach ginekologicznych i chirurgicznych, chemioterapii, radioterapii, podczas menopauzy.

Łagodzi takie dolegliwości jak: suchość, uczucie napięcia, pieczenia, świąd, bóle przy współżyciu płciowym.

MIRALEX

# Cicatridina®

Skład: kwas hialuronowy 5 mg

## Kwas hialuronowy to naturalna substancja regenerująca błonę śluzową pochwy.

**Przywraca normalną funkcję,  
 napięcie i elastyczność.**

**Kwas hialuronowy spełnia ważną funkcję  
 we wszystkich stadiach gojenia rany.**

Cicatridina® zawiera także inne sprawdzone składniki naturalne, wspierające działanie kwasu hialuronowego. Należą do nich naturalne wyciągi z roślin takich, jak:

**Aloe Vera  
 aloes**

- 60 mg
- hamuje proces zapalny
- wspomaga leczenie ran
- ułatwia wnikanie pozostałych substancji w głąb śluzówki

**Centella Asiatica  
 wąkrotka azjatycka**

- 60 mg
- pobudza syntezę kolagenu
- stymuluje proces gojenia ran

**Melaleuca Alternifolia  
 ekstrakt olejowy  
 z drzewa herbacianego**

- 2 mg
- działa antybakteryjnie

**Calendula Officinalis  
 kwiat nagietka**

- 60 mg
- działa przeciwzapalnie i przeciwobrzętkowo

Prawie każda kobieta doświadcza w swoim życiu dyskomfortu, a często przykrych dolegliwości, związanych z uszkodzeniem błony śluzowej pochwy. Czynniki, które sprzyjają bądź powodują to uszkodzenie, mogą być: porody, zabiegi i badania ginekologiczne, zbliżenia intymne z partnerem, a także chemioterapia i radioterapia.

W okresie menopauzy u kobiet również występują następujące dolegliwości: suchość pochwy, świąd, pieczenie i ból przy współżyciu płciowym. Szansą na przeciwdziałanie wszystkim tym przykrym objawom jest stosowanie globulek dopochwowych Cicatridina®, które regenerują błonę śluzową pochwy, przynosząc ulgę.

**po porodzie  
 po zabiegach ginekologicznych i chirurgicznych  
 po chemio- i radioterapii**

*Stosować przez 10-20 dni.*

**Łatwe zastosowanie  
 (wieczorem 1 globulka)**

**przy suchości pochwy w okresie przed- i menopauzalnym  
 w stanach zmniejszonego wydzielania estrogenów**

*Stosować codziennie przez 10 dni, następnie co 2-3 dzień.*



*Jedną globulkę umieścić wieczorem głęboko w pochwie.*



## Zmniejsza objawy już w pierwszym tygodniu leczenia!

**Idealny i bezpieczny preparat dla Pań,  
 u których nie można zastosować  
 hormonalnej terapii zastępczej,  
 w tym preparatów  
 zawierających estrogeny.**