



Melilax

MIKROWLEWKA Z PROMELAXIN
MICROCLISMĂ CU PROMELAXIN



Podwójne działanie:

- Usuwające
- Ochronne

Dublă Acțiune:

- De evacuare
- Protectoare

OCSZYZCZA JELITO BEZ PODRAŽNIEŃ, CHRONIĄC BŁONĘ ŚLUZOWĄ ODBYTU
ELIBEREAZĂ INTESTINUL FĂRĂ A IRITA, PROTEJÂND MUCOASA RECTALĂ

AKTYWNY KOMPLEKS
MIODÓW I POLISACHARYDÓW
Z ALOESU I ŚLAZU
DZIKIEGO

COMPLEX ACTIV DE MIERE
ȘI POLIZAHARIDE
DIN ALOE ȘI NALBĂ

WYRÓB MEDYCZNY klasy IIb
DISPOZITIV MEDICAL clasa IIb

PL Melilax jest innowacyjną mikrowlewką na bazie miodu, która łączy zrównoważone działanie usuwające, ochronne i łagodzące błonę śluzową odbytu, pomagającą w walce z uciążliwościami, podrażnieniami i stanem zapalnym, towarzyszącym zaparciom.

Podwójne działanie Melilax uzyskiwane jest dzięki **PROMELAXIN**, aktywnemu kompleksowi miodów nektarowych i spadziowych, odpowiednio wyselekcjonowanych i przetworzonych na podstawie zawartości monosacharydów, polisacharydów i melanoidyn, wzbożącemu o frakcję polisacharydową z aloesu i ślazu dzikiego.

JAK DZIAŁA

Melilax ma działanie usuwające, które nie podrażnia, czyli zapewnia fizjologiczny i zrównoważony bodziec aktywujący defekację.

Ponadto Melilax, dzięki swym cechom przypominającym śluz i dzięki swej lepkości, chroni błonę śluzową odbytu podczas przechodzenia stolca, odgrywając rolę nawilżacza, podobną do śluzu fizjologicznego.

Te szczególne właściwości, połączone z działaniem antyoksydacyjnym, nadają produktowi właściwości ochronne i łagodzące błonę śluzową, zapewniając pośrednie działanie przecizwzapalne, dzięki cechom fizycznym produktu.

WSKAZANIA

Melilax przeznaczony jest do leczenia zaparć, również w przypadku nadwrażliwości trzewnej (jak w przypadku okrężniczy drażliwej), szczelin i hemoroidów.

Produkt może być stosowany również w ciąży, przez kobiety karmiące piersią i przez niemowlęta karmione piersią.

SKŁAD

Substancje czynne 73,2%

Promelaxin aktywny kompleks miodów i polisacharydów z aloesu i ślazu dzikiego.

Mianowany na: monosacharydy ≥ 50%, polisacharydy (ciężar cząsteczkowy > 20.000 Dalton) ≥ 0,3%

Zawiera ponadto: mieszankę wodno-glicerynową, sok z cytryny, olejek eteryczny z lawendy.

DAWKOWANIE

Dorośli i młodzież od 12 roku życia: **1 mikrowlewka 10 g** w razie potrzeby. W przypadku uporczywych zaparć stosować 2 dawki jednocześnie.

1 mikrowlewka 5 g w razie potrzeby. W przypadku uporczywych zaparć stosować 2 dawki jednocześnie.

1 mikrowlewka 5 g w razie potrzeby.
połowa mikrowlewki 5 g w razie potrzeby.

Copii cu vîrstă între 3-12 ani:
Sugari cu vîrstă între 0-1 an:

MOD DE ADMINISTRARE

Aplicați câteva picături în zona perianală și introduceți ușor canula în rect. Apăsați microclismă până la capăt, iar la sfârșitul aplicării mențineți-o apăsată până la extracția completă a canulei, pentru a evita ca produsul să fie aspirat.

Nałożyć kilka kropel produktu wokół odbytu i wprowadzić delikatnie wlewkę do odbytu. Wcisnąć do końca mikrowlewkę i następnie trzymać ją wcisniętą do momentu całkowitego wyciągnięcia wlewki, aby uniknąć zasysania produktu.

PL OSTRZEŻENIA

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości lub alergii na jeden ze składników. W przypadku długotrwałych zaparć należy skonsultować się z lekarzem w celu wykluczenia innych schorzeń.

Mikrowleka jest jednorazowa dlatego nie może być ponownie użyta, gdy zużyje się tylko pół dawki, jak w w przypadku niemowląt karmionych piersią.

Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i światła. Trzymać z dala od dzieci. Okres ważności dotyczy produktu zamkniętego i właściwie przechowywanego.

OKRES WAŻNOŚCI

Zobacz datę ważności podaną na opakowaniu. Nie używać po upływie podanej daty ważności.

OPAKOWANIE W SPRZEDAŻY

Melilax: 6 mikrowlewek jednorazowych dla dorosłych i młodzieży, po 10 g każda

Melilax pediatric: 6 mikrowlewek jednorazowych dla niemowląt karmionych piersią dla dzieci, po 5 g każda.

ZAPARCIA

Termin "zaparcie" oznacza zwiększenie czasu przebywania stolca w ostatniej części jelita. W takich warunkach dochodzi do nagromadzenia suchego i twardego stolca, spowodowanego nadmiernym pochłanianiem płynów. Stolec ma niewielką objętość, oddawany jest nieregularnie (również mniej niż 3 defekacje na tydzień) lub z trudnością i/lub bólami (z powodu twardego stolca). W niektórych przypadkach może dochodzić również do uczucia niepełnego oddania stolca, pomimo regularnej defekacji lub wkładania znacznego wysiłku w proces oddawania stolca.

PRZYCZYNY

Główna przyczyną problemu, w niektórych grupach wiekowych, może być nieprawidłowy styl życia (niezrównoważona dieta, niewystarczające przyjmowanie wody, warzyw i owoców, mała aktywność fizyczna i siedzący tryb życia), zmiany przyzwyczajeń i warunków klimatycznych (jak na przykład podczas podróży), stosowanie niektórych leków, choroby układu trawiennego i metaboliczne (jak na przykład zespół wrażliwego jelita) lub szczególne sytuacje, takie jak stres, unieruchomienie-konieczność leżenia (zwłaszcza u osób starszych).

Hemoroidy, szczeliny i wypadanie odbytnicy mogą spowodować zaparcia lub mogą być ich konsekwencją. Trudności w oddawaniu stolca i podrażnienie tworzą faktycznie błędne koło, które nie pozwala na rozwiązanie problemu zaparć ani poprawy towarzyszącej im sytuacji.

Częstą przyczyną zaparć jest dobrowolna kontrola bodźca wydalania stolca, częsty problem wśród dzieci, zwłaszcza w pierwszych 2-3 latach życia. U dzieci ponadto może dojść do zaparć podczas przedłużonych stanów podgorączkowych, które powodują lekkie odwodnienie.

UŻYTECZNE PORADY

W wielu przypadkach zaparcia mogą zostać wyeliminowane przy pomocy diety bogatej w wodę i błonnik: faktycznie błonnik wiąże w różnym stopniu wodę i przyczynia się do zwiększenia objętości stolca. Ponadto ważna jest regularna aktywność fizyczna.

RO AVERTIZĂRI

A nu se utilizează în caz de hipersensibilitate sau alergie individuală la una sau mai multe componente ale produsului. În caz de constipație persistentă este important să consultați medicul pentru a exclude alte patologii.

Microclisma este de unică folosință, prin urmare, nu poate fi reutilizată atunci când se administrează jumătate de doză, cum ar fi în cazul sugarilor.

A se păstra la loc răcoros, uscat și ferit de surse de lumină și căldură.

A nu se lăsa la îndemână și la vederea copiilor mici. Data expirării se referă la produsul păstrat în ambalajul original și în condiții corespunzătoare.

DATA EXPIRĂRII

A se vedea data expirării înscrisă pe ambalaj. A nu se utilizează după data expirării indicată.

PREZENTARE AMBALAJ LA VÂNZARE

Melilax: 6 microclisme de unică folosință, de 10 g fiecare, pentru adulți și copii

Melilax Pediatric: 6 microclisme de unică folosință, de 5 g fiecare, pentru sugari și copii.

CONSTIPAȚIA

Termenul "constipație" este folosit pentru a indica, în mod substanțial, o creștere a timpului de staționare a materiilor fecale în ultima parte a intestinului. În această condiție are loc o acumulare de materii fecale uscate și dure, din cauza unei absorbtii excesive a lichidelor: materiile fecale au un volum mic, nu se eliberează în mod frecvent (chiar și mai puțin de 3 scaune pe săptămână) se eliberează cu dificultate și/sau durere (din cauza materiilor fecale dure). În unele cazuri, constipația se poate manifesta chiar și printr-o senzație de evacuare incompletă, în ciuda unei frecvențe normale sau prin nevoie unui efort foarte mare pentru evacuare.

CAUZELE

Principalele cauze care stau la baza problemei, la orice vîrstă, pot fi reprezentate de un stil de viață necorespunzător (regim alimentar dezechilibrat, consum insuficient de apă, fructe și legume, activitate fizică redusă și viață sedentară), schimbările proprietărilor obiceiurui personale sau a condițiilor climatice (cum ar fi, de exemplu, în cazul călătoriilor), folosirea anumitor medicamente, prezența unor boli gastrointestinale sau metabolice (cum ar fi sindromul intestinului iritabil) sau condiții speciale, cum ar fi stresul, imobilizarea la pat (în special la vîrstnici).

Hemoroizi, fisurile și prolapsul pot cauza constipația sau pot fi o consecință a acesteia. Dificultatea de evacuare și iritația locală, de fapt, declanșează un cerc vicios care împiedică atât rezolvarea constipației cât și îmbunătățirea problemelor asociate cu aceasta.

O cauză frecventă a constipației este controlul voluntar al stimulului de evacuare, o problemă frecventă la copii, mai ales în primii 2-3 ani de viață. De asemenea, la copii, se poate manifesta chiar și în timpul stăriilor febrile prelungite, care pot provoca ușoare condiții de deshidratare.

SFATURI UTILE

În multe cazuri, constipația poate fi corectată printr-o dietă bogată în apă și fibre: într-adevăr, acestea leagă apa, în măsuri diferite și contribuie la creșterea volumului materiilor fecale. De asemenea, este utilă activitatea fizică regulată.



0373



Data ostatniej aktualizacji / Data ultimei verificări: 05/2013



Aboca S.p.A. Società Agricola - Loc. Aboca, 20 - Sansepolcro 52037 (AR) - Italy - www.aboca.com

Company with certified management systems quality ISO 9001 and 13485 and system environmental management 14001.

Distributors:

PL PharmaGea sp. z o.o. 40-403 Katowice; ul. Oswobodzenia 1

RO SC Green Net SA, Strada ing. George Constantinescu nr. 2, sector 2, București cod poștal 020339, România