

Ulotka dla pacjenta

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować Revalid® ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.

- Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.
- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
- Jeśli objawy nasilają się lub nie ustępują po 3 miesiącach, należy skontaktować się z lekarzem.

Revalid®

Kapsułki

Skład

Jeden kapsułka zawiera jako substancje czynne:

DL-metioninę	100,0 mg
L-cystynę	50,0 mg
Pantotenu wapnia	50,0 mg
Witaminę B ₁ (chlorowodorek tiaminy)	1,5 mg
Witaminę B ₆ (chlorowodorek pirydoksyny)	10,0 mg
Kwas p-aminobenzoowy	20,0 mg
Żelazo (jako chelat)	2,0 mg
Cynk (jako chelat)	2,0 mg
Miedź (jako chelat)	0,5 mg
Wyciąg z prosa	50,0 mg
Wyciąg z kielków pszenicy	50,0 mg
Drożdże piwne	50,0 mg

Pozostałe składniki: krzemu dwutlenek koloidalny, żelatyna, indygotyna (E 132), żółcień chinolinowa (E 104).

Dostępne opakowania

Opakowanie zawierające 30, 90 lub 120 kapsulek.

Podmiot odpowiedzialny
Ewopharma AG
Vordergasse 43
8200 Schaffhausen, Szwajcaria

Wytwórca
Sipharm Sisseln 10
Bahnhofstrasse 14
CH-4334 Sisseln, Szwajcaria

Spis treści ulotki:

1. Co to jest Revalid[®] i w jakim celu się go stosuje
2. Zanim zastosuje się Revalid[®]
3. Jak stosować Revalid[®]
4. Możliwe działania niepożądane
5. Przechowywanie
6. Inne informacje

1. Co to jest Revalid[®] i w jakim celu się go stosuje

Revalid[®] to preparat złożony, zawierający witaminy z grupy B, aminokwasy siarkowe, sole mineralne, drożdże piwne, wyciąg z prosa i kielków pszenicy.

Aminokwasy zawierające siarkę (metionina i cystyna) są niezbędne do prawidłowej syntezy keratyny, podstawowego składnika białkowego włosów i paznokci. Pozostałe składniki biorą aktywny udział w przemianie białkowej, a ich niedobory sprzyjają schorzeniom włosów i paznokci.

Revalid[®] stosuje się jako preparat pomocniczy w leczeniu niedoborów aminokwasów siarkowych i witamin oraz związanych z nimi schorzeń włosów i paznokci.

2. Zanim zastosuje się Revalid[®]

Nie należy stosować leku Revalid[®] w przypadku znanej nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.

Informacja dla chorych na cukrzycę:

Wartość kaloryczna 1 kapsułki wynosi 6,7 kJ (1,6 kcal).

Stosowanie leku w okresie ciąży i karmienia piersią

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania preparatu Revalid[®] przez kobiety będące w ciąży lub karmiące piersią, dlatego nie należy go stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

Stosowanie leku u niemowląt i małych dzieci

Nie należy stosować preparatu Revalid[®] u niemowląt i małych dzieci ze względu na niewystarczające dane dotyczące stosowania leku w tej grupie wiekowej.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Brak danych dotyczących negatywnego wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi urządzeń mechanicznych w ruchu.

Stosowanie innych leków

Podczas leczenia przeciwbakteryjnymi sulfonamidami, preparat Revalid[®] należy odstawić, gdyż jeden z jego składników: kwas p-aminobenzoowy osłabia przeciwbakteryjne działanie sulfonamidów.

3. Jak stosować preparat Revalid[®]

Jak często i jak duże ilości preparatu Revalid[®] należy przyjmować

Zwykle stosuje się 1 kapsułkę 3 razy na dobę.

W przypadkach zaawansowanych schorzeń włosów lub paznokci zaleca się rozpoczęcie leczenia większymi dawkami: 3 razy na dobę po 2 kapsułki przez jeden miesiąc, a następnie 3 razy na dobę po 1 kapsułce.

W jaki sposób i kiedy należy przyjmować preparat Revalid[®]

Lek należy przyjmować bezpośrednio przed lub podczas posiłków, z dostateczną ilością płynu.

Jak długo należy stosować preparat Revalid[®]

Mimo iż zadowalające wyniki mogą wystąpić już pod koniec pierwszego miesiąca podawania, leczenie preparatem Revalid[®] należy kontynuować przez trzy miesiące. W razie konieczności, leczenie może być przedłużone lub powtarzane.

W przypadku przyjęcia większej dawki preparatu Revalid[®] niż zalecana:

Brak doniesień dotyczących specyficznych objawów w wyniku przedawkowania preparatu Revalid[®]. Możliwe jest wystąpienie zaburzeń ze strony przewodu pokarmowego, np. biegunki.

W razie jakichkolwiek wątpliwości, poinformuj swojego lekarza o fakcie przedawkowania, aby mógł podjąć decyzje odnośnie dalszego postępowania.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Revalid[®] może powodować działania niepożądane.

Po dawce 6 kapsulek na dobę mogą wystąpić lekkie zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego (biegunki). W takich przypadkach najlepiej stosować dawkę trzy razy na dobę po 1 kapsułce.

U niektórych osób w czasie stosowania preparatu Revalid® mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych niż wymienione w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5. Przechowywanie

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w suchym miejscu, chronić przed działaniem światła i wysokich temperatur.

Nie należy stosować leku po terminie ważności podanym na opakowaniu.

6. Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji, należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Ewopharma AG Sp. z o.o.
Ul. Świętokrzyska 36 m. 16
00-116 Warszawa

Data opracowania ulotki: 16.09.2003