



Należy zapoznać się z właściwościami leku przed jego zastosowaniem.

SOYFEM®

Glycine max semen extr. sicc.

Tabletki powlekane
30, 60 tabletek

Skład leku:

Jedna tabletkę zawiera 100 mg wyciągu z nasion soi (w tym 26 mg zespołu izoflawonów przeliczonych na genisteinę) oraz substancje pomocnicze: celulozę mikrokrystaliczną, poliwinylpyrrolidon, stearynian magnezu, hydroksypropylometylocelulozę, talk oraz glicerynę.

Opis działania:

W preparacie Soyfem główne substancje aktywne stanowią genisteina i daidzeina, zaliczane do izoflawonów. Posiadają one zdolność wiązania się z receptorami estrogenowymi, co wynika z podobieństwa ich budowy chemicznej do endogennych estrogenów (tzn. wytwarzanych przez organizm), dlatego popularnie nazywa się je fitoestrogenami.

Fitoestrogeny genisteina i daidzeina zawarte w soi, działając podobnie do estrogenów, lecz słabiej, chronią przed zaburzeniami związanymi z fizjologicznym spadkiem produkcji estrogenów u kobiet w okresie okołomenopauzalnym i pomenopauzalnym.

Wskazania do stosowania:

Preparat Soyfem stosuje się:

- u kobiet z dolegliwościami okresu menopauzy: przyływami uczucia gorąca, nadmiernym poceniem się, zakłóceniami snu, uczuciem napięcia nerwowego i niepokoju.
- w profilaktyce chorób układu krążenia, wraz z zachowaniem odpowiedniej diety.

Przeciwwskazania:

Nie stwierdzono.





Ostrzeżenia i specjalne środki ostrożności:

Dla preparatów zawierających izoflawony nie są wymagane specjalne środki ostrożności. Ze względu na słabe działanie estrogenne, zaleca się przeprowadzenie wywiadu z pacjentką na temat równoczesnego stosowania doustnych środków antykoncepcyjnych.

Stosowanie w okresie ciąży i karmienia piersią:

Nie zaleca się stosowania preparatu w okresie ciąży i karmienia.

Wpływ na zdolność kierowania pojazdami mechanicznymi, obsługę maszyn i sprawność psychofizyczną:

Lek nie wpływa na zdolność do prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługę maszyn oraz nie upośledza sprawności psychofizycznej.

Oddziaływanie z innymi lekami (interakcje):

Nie są znane interakcje z innymi lekami.

Dawkowanie i sposób podawania:

Lek przyjmuje się doustnie 2 razy na dobę po 1 lub 2 tabletki.

Przedawkowanie:

Nie opisywano.

Działania niepożądane:

Przy zalecanym dawkowaniu objawy niepożądane nie są znane.

*Nie stosować leku po upływie terminu jego ważności.
Lek przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w suchym miejscu,
w temperaturze pokojowej, tj. 15° C – 25° C.*

Dostępne opakowania:

30 lub 60 tabletek w blistrach po 10 tabletek.

Nazwa i adres wytwórcy: **BIOFARM®**,

60-198 POZNAŃ, ul. Wałbrzyska 13

Data opracowania ulotki: luty 2002

20061018

